

5歳から11歳のお子さんに新型コロナワクチンの接種を検討している保護者の方へ

愛育病院では港区の集団接種会場として3/1より5-11歳のお子さんを対象とした新型コロナワクチンの接種を開始します。ファイザー製のワクチンを成人の1/3の量を3週間の間隔で2回接種します。接種に際してはワクチンによる副反応と感染してしまった場合の影響をご家庭の状況を加味してご検討下さい。集団接種のため接種当日に接種に関する個別相談はお受けできません。事前にみなと保健所ホームページの5-11歳の接種に関する情報をご参照下さい。

接種に不安や質問がある場合は

みなとワクチン安心相談ダイヤル 0120-607-567 (平日 8:30-17:15)

もしくはかかりつけ医にご相談ください。

もし副反応が生じた場合は愛育病院で・診察を受け付けます。詳細は接種日にお渡しする案内をご参照下さい。

米国疾病対策センターがまとめた5-11歳対象の[副反応のデータ](#)(CDC HPへリンク)と愛育病院で接種した[12-15歳対象の新型コロナワクチンの副反応出現率](#)(みなと保健所HPへリンク)を比較すると、その出現率は低値でした。ワクチンの接種量が少ないことが副反応出現率に影響していると考えられています。

米国におけるインターネットによる副反応報告システム(v-safe)を介した副反応報告は下記の通りでした。v-safeはボランティアで入力協力をした接種者に対する副反応出現率のため接種者全体の副反応の出現率と異なる可能性があります。死亡例は多臓器に慢性疾患のある2名で認められましたがワクチン接種との因果関係は不明でした。心筋炎は11名で確認されましたがいずれも軽症でした。

v-safe に報告された 5-11 歳における 副反応出現率(%)		
	1回目 (N = 42,504)	2回目 (n = 29,899)
そう痒	3.8	3.7
痛み	52.7	55.8
発赤	3.7	4.4

腫脹	3.9	4.9
腹痛	5.1	6.4
筋肉痛	7.1	10.2
悪寒	3.9	6.8
下痢	2.6	2.2
倦怠感	20.1	25.9
発熱	7.9	13.4
頭痛	13.9	19.8
関節痛	2.1	2.9
嘔気	5	6.9
発疹	1.2	1
嘔吐	2.3	2.7
日常生活への支障	5.1	7.4
通学の支障	7.9	10.9
治療を要した	1.2	1.1
電話診察	0.3	0.2
医療機関受診	0.6	0.6
救急外来受診	0.1	0.1
入院	0.02	0.02

その他に参考にさせていただきたい情報

日本小児科学会

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=404

日本小児科医会

<https://www.jpa-web.org/blog/uncategorized/a275>

2022.2.22 愛育病院小児科